

## Meta-analysis comparing the efficacy of Exposure and Response Prevention, Cognitive-Behavior Therapy and Third Wave of Behavior Therapies on Obsessive-Compulsive Disorder

---

M. Akbari<sup>1</sup> & Z. S. Hosayni<sup>2</sup>

1. \*Asistant Professor, Department of Clinical Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran

2. M.A. of Psychology, Zanjan University, Zanjan, Iran

---

### Abstract

**Aim:** The purpose of this study was to compare the efficacy of Exposure and Response Prevention Therapy (ERP), Cognitive-Behavior Therapy (CBT) and Third-Wave Behavior Therapies on Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) in Iranian population. **Method:** The research method was a meta-analysis and the statistical population of all researches conducted in Iran between 2005 and 2017 was 58 studies that among them, 34 studies were selected according to the inclusion and exclusion criteria as the research sample and finally reported 13 effect sizes for ERP, 19 effect sizes for CBT and 12 effect sizes for Third-Wave Behavior Therapies. The effect size index was the standardized mean difference also statistical analysis was done by comprehensive meta-analysis software. **Results:** The results showed that ERP ( $d= 1.815$ ,  $P= 0.05$ ), CBT ( $d= 1.542$ ,  $P= 0.05$ ) and Third-Wave Behavior Therapies ( $d= 1.688$ ,  $P= 0.05$ ) had been effective for OCD. In addition, study of type of treatment as a moderating variable didn't show significant difference. **Conclusions:** Based on the findings of this meta-analysis, it can be concluded that exposure is the most important therapeutic process in the treatment of OCD which it is an essential component in all three therapeutic approaches, and probably adding cognitive, mindfulness and acceptance components will not significantly contribute to the efficacy of behavioral therapy based on ERP in Iranian patients with OCD.

**Key words:** behavior, cognitive, exposure, meta-analysis, obsessive-compulsive, response prevention, third wave

**Citation:** Akbari, M., & Hosayni, Z. S. (2019). Meta-analysis comparing the efficacy of Exposure and Response prevention, Cognitive-Behavior Therapy and Third Wave of Behavior Therapies on Obsessive-Compulsive Disorder. *Quarterly of Applied Psychology*, 12(4): 473-490.

Received: 29 April 2018  
Accepted: 23 November 2018

Corresponding author:  
M.akbari@khu.ac.ir

## فراتحلیل مقایسه اثربخشی درمان مواجهه و پیشگیری از پاسخ، درمان شناختی-رفتاری و درمان‌های موج سوم رفتاری در اختلال وسوسی-اجباری

مهدی اکبری<sup>۱</sup> و زهراسادات حسینی<sup>۲</sup>

۱. استادیار گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

۲. کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه زنجان، ایران

### چکیده

هدف: هدف پژوهش مقایسه اثربخشی درمان مواجهه و پیشگیری از پاسخ، درمان شناختی-رفتاری و درمان‌های موج سوم رفتاری بر اختلال وسوسی-اجباری در جامعه ایرانی بود. روش: روش پژوهش فراتحلیل و جامعه آماری شامل پژوهش‌های انجام شده در ایران بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ به تعداد ۵۸ پژوهش بود که از میان آن‌ها ۳۴ پژوهش با توجه به ملاک‌های ورود و خروج به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در نهایت ۱۳ اندازه اثر برای درمان مواجهه و پیشگیری از پاسخ، ۱۹ اندازه اثر برای درمان شناختی-رفتاری و ۱۲ اندازه اثر برای درمان‌های موج سوم رفتاری گزارش شد. مقیاس اندازه اثر تفاوت میانگین معیار بود و تحلیل آماری با نرم افزار جامع فراتحلیل انجام شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که شیوه‌های مداخله‌ای مواجهه و پیشگیری از پاسخ ( $P=0.05$ ,  $d=1/815$ )، شناختی-رفتاری ( $P=0.05$ ,  $d=1/542$ ) و موج سوم رفتاری ( $P=0.05$ ,  $d=1/688$ ) در درمان اختلال وسوسی-اجباری مؤثر بوده‌اند. بررسی متغیر نوع درمان، به عنوان معنادار تغییر تعییل کننده نشان داد که تفاوت بین درمان‌های مورد استفاده در پژوهش معنادار نیست. نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های فراتحلیل حاضر می‌توان چنین نتیجه گرفت که مهم‌ترین فرایند درمانی در درمان اختلال وسوسی-اجباری، مواجهه است که جزء مؤلفه اساسی هر سه رویکرد درمانی محسوب می‌شود و احتمالاً اضافه کردن مؤلفه‌های شناختی، ذهن آگاهی و پذیرش خیلی به تقویت اثربخشی درمان رفتاری مبتنی بر مواجهه و پیشگیری از پاسخ در درمان بیماران ایرانی دچار اختلال وسوسی-اجباری منجر نمی‌شود.

**کلیدواژه‌ها:** پیشگیری از پاسخ، رفتاری، شناختی، فراتحلیل، مواجهه، موج سوم، وسوسی-اجباری

استناد به این مقاله: اکبری، مهدی، و حسینی، زهرا سادات. (۱۳۹۷). فراتحلیل مقایسه اثربخشی درمان مواجهه و پیشگیری از پاسخ، درمان شناختی-رفتاری و درمان‌های موج سوم در درمان اختلال وسوسی-اجباری. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، ۱۲ (۴۸) پاپایی: ۴۷۳-۴۹۰.

ردیف  
پیش  
مقاله:  
۹/۰۲/۰۲  
۹/۰۹/۰۷  
۹/۰۹/۰۷

توییزندۀ مسئول:  
M.akbari@knu.ac.ir

## مقدمه

پژوهش‌های همه‌گیرشناسی اخیر، نرخ شیوع سالانه اختلال وسواسی-اجباری<sup>۱</sup> را بین ۱/۲ درصد و نرخ شیوع در طول عمر را بین ۲/۳ درصد برآورد کرده‌اند (اوسلند، آرنولد و پرینگشین، ۲۰۱۸). اختلال وسواسی-اجباری، بدون درمان، سیزی مزمن دارد (مارکس، ویسبرگ، دیک و کلر، ۲۰۱۱) و با آسیب جدی در عملکرد کلی (مرکرین، لارسون، آلدا، بدلوین، گود و همکاران، ۲۰۱۰؛ استروج، آبرامویچ و کلی، ۲۰۰۹)، کیفیت زندگی پایین (فونتنل، فونتنل، برگس، پرازرس، رنج و همکاران، ۲۰۱۰) و سوء مصرف مواد (مانسیبو، گرانت، پینتو، ایسن و راسموزن، ۲۰۰۹) همراه است. لذا در چنین شرایطی، لزوم شیوه‌های درمانی اثربخش به منظور بهبود افرادی که از علایم اختلال وسواسی-اجباری رنج می‌برند؛ ضروری است.

مروری بر پژوهش‌های انجام شده در چند دهه اخیر در حوزه درمان‌های روان‌شناختی اختلال وسواسی-اجباری نشان می‌دهد که از بین درمان‌های غیردارویی، درمان رفتاری مواجهه و پیشگیری از پاسخ<sup>۲</sup> و درمان شناختی-رفتاری<sup>۳</sup> برای درمان اختلال وسواسی-اجباری از اثربخشی بالایی برخوردارند و تقریباً بین ۶۰ تا ۸۵ درصد بیماران اختلال وسواسی-اجباری پس از دوره کامل درمان مواجهه و پیشگیری از پاسخ، بهبود قابل توجهی را نشان می‌دهند (پودا، سوسیو و آردلین، ۲۰۰۹). اما این درمان محدودیت‌هایی نیز دارد. از جمله اینکه حدود ۵ تا ۲۲ درصد بیماران اختلال وسواسی-اجباری از شروع درمان مواجهه و پیشگیری از پاسخ خودداری می‌کنند (توهیگ، هیز، پلامب، پرویت، کولینز و همکاران، ۲۰۱۰) و تقریباً ۲۵ درصد بیماران، درمان را قبل از اتمام ترک می‌کنند (آبراموویتز، لاکی و ویتون، ۲۰۰۹). همچنین به طور تقریبی ۴۰ تا ۴۰ درصد بیماران وسواسی پاسخ ضعیفی به درمان مواجهه و پیشگیری از پاسخ می‌دهند (ماهر، هوپرت، چن، دونان، فوئا و همکاران، ۲۰۱۰) و تنها ۲۵ درصد بیماران بهبودی کامل را پس از درمان با روش مواجهه و پیشگیری از پاسخ، تجربه می‌کنند.

در پاسخ به این محدودیت‌ها، رویکردهای شناختی-رفتاری در تبیین اختلال وسواسی-اجباری موفقیت چشمگیری داشته‌اند (تورپ، داهل، کارفیدینسون، تومسین، والدره‌اگ و همکاران، ۲۰۱۵). با وجود این، میزان اثربخشی درمان شناختی-رفتاری در مقایسه با اثربخشی درمان مواجهه و پیشگیری از پاسخ چه به تهایی یا در ترکیب با درمان مواجهه و پیشگیری از پاسخ، در بهبود علایم اختلال وسواسی-اجباری بهتر نیست (روس-آلکازار، سالچز-مکا، گومز-کنسا و مارین-مارتینز، ۲۰۰۸). بنابراین، به رغم وجود درمان‌های بسیار موثر در کاهش علایم بیماران دچار اختلال

1. Obsessive-Compulsive Disorder (OCD)

2. Exposure and Response Prevention (ERP)

3. Cognitive-Behavioral Therapy (CBT)

وسواسی-اجباری، هنوز بیماران زیادی به این درمان‌ها پاسخ نداده‌اند و همچنان از عالیم باقیمانده اختلال خود رنج می‌برند. در چنین شرایطی، رویکردهای درمانی جدیدی برای این بیماران لازم است.

درمان‌های مرسوم به موج سوم رفتار درمانی پیش قراول این نگاه تازه به درمان اختلال وسواسی-اجباری است. جهت‌گیری اصلی این درمان‌ها این است که برخلاف رویکردهای شناختی رفتاری که بر تغییر محتوای افکار بیماران اختلال وسواسی-اجباری متمرکز است، بر فرایند افکار و ارتباط افراد با افکارشان تمرکز می‌کند (کال، وینتر و شرایگر، ۲۰۱۲). به تازگی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد<sup>۱</sup> یکی از شیوه‌های درمانی جدید و نوید بخشی است که در چارچوب این رویکرد برای بهبود اثربخشی بیماران دچار اختلال وسواسی-اجباری مطرح شده است (هیز، استروساهل، و ویلسون، ۲۰۱۱). از دیدگاه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد مفاهیمی چون اجتناب تجربه‌ای، همچوشی شناختی و کاهش خزانه رفتاری فرد بهدلیل پیروی از قواعد کلامی مرتبط با افکار وسواسی و عواطف منفی در شکل-گیری و تداوم اختلال وسواسی-اجباری نقش مهمی را ایفا می‌کنند. بنابراین هدف از رویکرد پذیرش و تعهد در درمان اختلال وسواسی-اجباری کمک به بیمار برای ایجاد ارتباط جدید با افکار وسواسی و احساسات اضطراب برانگیز است تا او بتواند وسوس فکری را فقط بهصورت فکر و اضطرابش را بهصورت هیجان تجربه نماید (توهیگ، آبرامویست، بلوئت، فابریکانت، جاکوبی و همکاران، ۲۰۱۵). یکی دیگر از درمان‌های موج سوم، فراشناخت درمانی<sup>۲</sup> است که بر تغییر راهبردهایی تأکید دارد که بیماران به کار بگیرند تا بتوانند به رفتار خود جهت دهنند. این رویکرد بر نشانه‌ها و معیارهای ناکارامد درونی که فرد برای توقف اعمال وسواسی به کار می‌برد، تأکید می‌کند. از دیدگاه فراشناختی، تداوم این اختلال به این صورت است که ابتدا فعل شدن باورهای فراشناختی ناکارامد باعث می‌شود که فرد فراشناختوارهای مزاحم را به عنوان نشانه‌های از خطر بهصورت منفی ارزیابی کند. ارزیابی منفی فراشناختوارهای مزاحم به نوبه خود منجر به بروز هیجان‌های منفی شدیدی می‌شود که اغلب به شکل اضطراب تجربه می‌شود. وقتی شناختوارهای مزاحم بهصورت منفی آیینمند و خنثی ساز می‌شود تا خطر تهدید را کاهش دهد (فیشر و ولز، ۲۰۰۸).

شناخت درمانی مبتنی بر توجه آگاهی<sup>۳</sup> (هرستان، روس، وودرهولز، هیدنریچ، نیسن و همکاران، ۲۰۱۲) نیز از جمله درمان‌های موج سوم است که برای درمان اختلال وسواسی-اجباری به کار گرفته می‌شود. این درمان رویکرد متفاوتی را در رابطه با علائم خستگی، اضطراب‌ها و وسوس

1. Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

2. Metacognitive Therapy

3. Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)

پیشنهاد کرده است (طاهری و سجادیان، ۱۳۹۶؛ محمدی شیرمحله، جمهوری، کراسکیان و مليحی‌الذکرینی، ۱۳۹۵) که متفاوت از رویکردهای شناختی-رفتاری سنتی است. فنون این درمان به بیماران وسوسی کمک می‌کند تا در موقعیت‌های مختلف و بهویژه زمانیکه حملات وسوسی به شکل مرور افکار یا اجبار در انجام اعمالی خاص، بیمار را تحت فشار قرار می‌دهد؛ ذهن خود را به پدیده‌های دیگری معطوف و بهواسطه تمرکز بر حالت‌های احساسی و جسمانی سدی در مقابل نشخوارها و اعمال تکرارشونده ایجاد کند.

مرور پژوهش‌های انجام شده در زمینه اثربخشی هر سه نسل درمان‌های رفتاری حاکی از اثربخشی آن‌ها دارد. اما لازم به ذکر است که هر یک از درمان‌های نسل دوم و سوم رفتاری در پاسخ به محدودیت‌های درمان‌های قبلی و افزایش اثربخشی مطرح شده‌اند؛ بنابراین سیر تحولی این درمان‌ها از افزایش اثربخشی این درمان‌ها حمایت می‌کند. برای بررسی این ادعا که در بین این سه نسل از درمان‌های رفتاری، کدامیک از آن‌ها در درمان جمعیت مبتلایان کشورمان به اختلال وسوسی-اجباری از اثربخشی بیشتری برخوردار است؛ انجام یک فراتحلیل، به شفاف‌سازی مقدار واقعی تأثیر این رویکردها بر کاهش علائم وسوسی-اجباری در ایران و مقایسه میزان اثربخشی آن‌ها کمک شایانی خواهد کرد. بر همین اساس، در پژوهش حاضر میزان اثربخشی سه نسل از درمان‌های رفتاری در قالب فراتحلیل مقایسه و فرضیه‌های زیر آزمون شد.

۱. درمان مواجهه و پیشگیری از پاسخ بر کاهش نشانه‌های اختلال وسوسی-اجباری در پژوهش‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ موثر بوده است.

۲. درمان شناختی-رفتاری بر کاهش نشانه‌های اختلال وسوسی-اجباری در پژوهش‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ موثر بوده است.

۳. درمان‌های مرسوم به موج سوم بر کاهش نشانه‌های اختلال وسوسی-اجباری در پژوهش‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ موثر بوده است.

۴. میزان اثربخشی درمان‌های مواجهه و پیشگیری از پاسخ، درمان شناختی-رفتاری و درمان‌های موج سوم بر کاهش نشانه‌های اختلال وسوسی-اجباری در پژوهش‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ تفاوت دارد.

## روش

روش پژوهش با توجه به هدف فراتحلیل بود. فراتحلیل با ترکیب و تلفیق یافته‌های کمی حاصل از مجموعه‌ای از پژوهش‌های مرتبط با موضوع می‌تواند؛ سازماندهی نتایج را ممکن سازد (بورنستین، هجز، هیجین و روزنтал، ۲۰۰۹). در این روش ابتدا لازم است که به منظور جمع‌آوری پژوهش‌های

مورد نیاز جستجویی گسترده صورت پذیرد و پس از آن با توجه به ملاک‌های ورود و خروج، پژوهش‌های مورد قبول انتخاب و در انتهای اندازه اثر تکی هر پژوهش و اندازه اثر ترکیبی پژوهش‌های پیشین محاسبه و گزارش می‌شود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه پژوهش‌های انجام شده بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ به تعداد ۵۸ پژوهش بود که اثریخشی درمان‌های مواجهه و جلوگیری از پاسخ، درمان شناختی-رفتاری و درمان‌ها موج سوم از جمله درمان‌های مبتنی بر پذیرش و تعهد، توجه آگاهی و فراشناخت درمانی را بر اختلال وسوسی-اجباری بررسی کرده بودند. از میان آنها ۳۴ پژوهش با توجه به ملاک‌های ورود و خروج انتخاب شد. برای جستجوی پژوهش‌های مورد نیاز از کلیدواژه‌هایی مثل مواجهه، جلوگیری از پاسخ، شناختی-رفتاری، پذیرش و تعهد، ذهن آگاهی، توجه آگاهی، فراشناخت درمانی، وسوسی-اجباری، وسوس فکری-عملی و دارو درمانی استفاده شد. ملاک‌های ورود به مطالعه حاضر، پژوهش‌های دارای طرح آزمایشی کامل، شبه آزمایشی یا نیمه آزمایشی، اجرا در نمونه بزرگسال، داشتن دست کم ۶ آزمونی در هر گروه، گزارش اندازه اثر یا اطلاعات لازم برای محاسبه آن، چاپ یا ارائه اثر، اجرا بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ در نمونه‌های ایرانی و گزارش در نشریه‌ها و همایش‌ها بود و ملاک‌های خروج نیز شامل استفاده از ابزار پژوهش نامعتبر نظیر ابزار پژوهشگر ساخته، عدم بررسی و گزارش روایی و اعتبار ابزار، غیر کمی بودن نظری مصاحبه یا مشاهده و مشخص نکردن شیوه اجرایی برای اطمینان از روش درمانی به کار رفته بود.

## ابزار پژوهش

ابزار و منابع جستجو در این پژوهش شامل منابع پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، بانک اطلاعات نشریات کشور، سیویلیکا و جستجوگر گوگل بود. **شیوه اجرا.** برای جمع‌آوری اطلاعات لازم، از فهرست بازبینی تحلیل محتوا و برای تحلیل داده‌های حاصل از پژوهش‌های گزیده شده از نرم افزار جامع فراتحلیل<sup>1</sup> که به منظور انجام پژوهش‌های فراتحلیل طراحی شده است (بورنستین و همکاران، ۲۰۰۵) و برای محاسبه اندازه اثر از شاخص «d»، برای بررسی سوگیری انتشار از روش نمودار قیفی<sup>2</sup>، برای تعیین تعداد پژوهش‌های گم شده از آزمون N ایمن از خطا (بورنستین و همکاران، ۲۰۰۹) و برای مطالعه متغیر تعدیل کننده از آزمون ناهمگونی استفاده شد. در فراتحلیل برای ترکیب و تحلیل نتایج دو رویکرد شامل الگوی اثرهای ثابت و الگوی اثرهای تصادفی وجود دارد که هریک بر اساس ماهیت پژوهش‌های به کار گرفته شده انتخاب می‌شود. در پژوهش حاضر بر اساس نظر بورنستین و همکاران (۲۰۰۹) به دلیل

1. Comprehensive Meta-Analysis (CMA.2)

2. Funnel Plot

اینکه توزیعی از اندازه اثراها وجود داشت، از الگوی اثراهای تصادفی استفاده و اطلاعات سند شناختی هر مطالعه و اندازه اثر مربوط به آن در مقیاس تفاوت میانگین معیار (d) آن‌ها گزارش شد.

### یافته‌ها

در این پژوهش با توجه به این موضوع که در برخی از پژوهش‌ها زیرمقیاس‌های وسوسی-اجباری نیز گزارش شده بود، در مجموع تعداد ۸۲ اندازه اثر حاصل شد.


**جدول ۱. اطلاعات توصیفی پژوهش‌های فراتحلیل شده به همراه اندازه اثر هر پژوهش**

ردیف/نوع درمان	اندازه اثر						
۱. مواجهه	۱/۴۹	۲. شناختی	۰/۲۸۴	۳. شناختی	۰/۲۹	۴. شناختی	۰/۷۸۵
۲. مواجهه	۰/۱۴۳	۳. شناختی	۱/۰۹۵	۴. شناختی	۱/۰۹۵	۵. شناختی	۰/۶۴۹
۳. مواجهه	۹/۸۵	۶. شناختی	۱/۰۹۵	۷. شناختی	۱/۰۹۵	۸. شناختی	۰/۶۹۳
۴. مواجهه	۱/۰۵	۹. شناختی	۱/۰۹۵	۱۰. شناختی	۱/۰۹۵	۱۱. شناختی	۰/۳۳۹
۵. مواجهه	۱/۶۰	۱۲. شناختی	۰/۷۴۵	۱۳. شناختی	۰/۷۴۵	۱۴. شناختی	۱/۷۲۰
۶. مواجهه	۲/۷۰	۱۵. شناختی	۱/۴۵۵	۱۶. شناختی	۱/۴۵۵	۱۷. شناختی	۱/۱۴۷
۷. مواجهه	۲/۴۴	۱۸. شناختی	۲/۳۹۹	۱۹. شناختی	۲/۳۹۹	۲۰. شناختی	۱/۲۶۸
۸. مواجهه	۲۲/۷۴	۲۱. شناختی	۲/۰۷۹	۲۲. شناختی	۲/۰۷۹	۲۳. شناختی	۳/۱۵۲
۹. مواجهه	۲/۰۰	۲۴. شناختی	۱/۰۵۸	۲۵. شناختی	۱/۰۵۸	۲۶. شناختی	۱/۷۵۱
۱۰. مواجهه	۱/۱۲	۲۷. شناختی	۱/۱۴۳	۲۸. شناختی	۱/۱۴۳	۲۹. شناختی	۰/۵۰۹
۱۱. مواجهه	۲/۱۲	۳۰. شناختی	۱/۱۶۵	۳۱. شناختی	۱/۱۶۵	۳۲. شناختی	۱/۶۲۹
۱۲. مواجهه	۰/۰۲	۳۳. شناختی	۱/۰۹۵	۳۴. شناختی	۱/۰۹۵	۳۵. شناختی	۲/۰۸۴
۱۳. مواجهه	۰/۷۳	۳۶. شناختی	۲/۰۵۵	۳۷. شناختی	۲/۰۵۵	۳۸. شناختی	۰/۹۶۵
۱۴. مواجهه	۲/۷۶	۳۹. شناختی	۳/۰۲۲	۴۰. شناختی	۳/۰۲۲	۴۱. شناختی	۱/۴۹۹
۱۵. مواجهه	۲/۰۵	۴۲. شناختی	۲/۰۲۱	۴۳. شناختی	۲/۰۲۱	۴۴. شناختی	۱/۱۶۹
۱۶. مواجهه	۱/۸۴	۴۵. شناختی	۳/۲۳۷	۴۶. شناختی	۳/۲۳۷	۴۷. شناختی	۳/۷۰۴
۱۷. مواجهه	۱/۶۸	۴۸. شناختی	۱/۳۴۲	۴۹. شناختی	۱/۳۴۲	۵۰. شناختی	۱/۲۰۶
۱۸. مواجهه	۳/۷۴	۵۱. شناختی	۱/۳۴۲	۵۲. شناختی	۱/۳۴۲	۵۳. شناختی	۴/۱۱۴
۱۹. مواجهه	۱/۹۹	۵۴. شناختی	۳/۳۶۲	۵۵. شناختی	۳/۳۶۲	۵۶. شناختی	۱/۰۱۱
۲۰. شناختی	۵/۵۱	۵۷. شناختی	۰/۰۰۰۱	۵۸. شناختی	۰/۰۰۰۱	۵۹. شناختی	۱/۴۴۰
۲۱. شناختی	۲/۸۹	۶۰. شناختی	۰/۵۸۴	۶۱. شناختی	۰/۵۸۴	۶۲. شناختی	۰/۰۰۰۱
۲۲. شناختی	۰/۷۹	۶۳. شناختی	۲/۰۰۴	۶۴. شناختی	۲/۰۰۴	۶۵. شناختی	۱/۱۴۵
۲۳. شناختی	۱/۳۹	۶۶. شناختی	۱/۵۱۰	۶۷. شناختی	۱/۵۱۰	۶۸. شناختی	۰/۷۰۶
۲۴. شناختی	۵/۶۷	۶۹. شناختی	۱/۱۸۵	۷۰. شناختی	۱/۱۸۵	۷۱. شناختی	۱/۷۰
۲۵. شناختی	۷/۰۲۲	۷۲. شناختی	۱/۵۷۲	۷۳. شناختی	۱/۵۷۲	۷۴. شناختی	۱۱/۰۲
۲۶. شناختی	۱/۷۲	۷۵. شناختی	۲/۱۶۶	۷۶. شناختی	۲/۱۶۶	۷۷. شناختی	۱۷/۷۶
۲۷. شناختی	۰/۳۷	۷۸. شناختی	۲/۳۹۵	۷۹. شناختی	۲/۳۹۵	۸۰. شناختی	
۲۸. شناختی	۱/۴۰	۸۱. شناختی	۳/۱۸۲	۸۲. شناختی	۳/۱۸۲	۸۳. شناختی	

جدول ۱ اندازه اثراهای پژوهش‌های به کار گرفته شده در این پژوهش را به تفکیک روش درمانی نشان می‌دهد. اندازه اثراهای گزارش شده بین ۰/۰۰۰۱ و ۲۲/۷۴ است. همچنین اندازه اثر مربوط به پژوهش‌های نمونه به تفکیک پارامترهای پرسشنامه‌ها در قالب نمره کل، وسوس افکری، وسوس


## فراتحلیل مقایسه اثربخشی درمان مواجهه و پیشگیری از پاسخ ...

عملی، تردید، وارسی، شست و شو، کندی و تکرار و آلودگی در پیوست آمده است. از سوی دیگر به دلیل اینکه تمامی پژوهش‌های نمونه، اندازه اثرها را به تفکیک پارامترها مشخص نکرده بودند؛ تنها ۵۱ اندازه اثر که در قالب نمره کل، وسوس عملی و وسوس فکری مطرح شده بودند؛ در پژوهش حاضر به کار گرفته شد. یکی از آزمون‌های مهم در هر فراتحلیل، بررسی سوگیری انتشار است. سوگیری انتشار در فراتحلیل ناشی از این موضوع است که احتمال انتشار نتایج پژوهش‌های دارای معناداری مثبت، نسبت به سایر پژوهش‌ها بیشتر است؛ به این منظور از نمودار قیفی استفاده شد. وجود متقارن در نمودار قیفی دال بر عدم وجود سوگیری خواهد بود. نمودار قیفی پژوهش حاضر در شکل ۱ نمایش داده شده است.



شکل ۱. نمودار قیفی قبل از تحلیل حساسیت

شکل ۱ نشان می‌دهد که چند پژوهش با اندازه اثر بالا منجر به عدم تقارن نمودار قیفی شده است. برای کاهش عدم تقارن از روش تحلیل حساسیت استفاده و در این راستا از ۵۱ اندازه اثر اولیه، مقادیر بالای ۴/۵ به عنوان داده‌های پرت شامل پژوهش‌های شماره ۳، ۸، ۲۰، ۲۴، ۲۵، ۸۱ و ۸۲ از تحلیل کنار گذاشته شد و نمودار قیفی به طور نسبی بهبود یافت و در شکل ۲ ارائه شد.



شکل ۲. نمودار قیفی بعد از تحلیل حساسیت

در شکل ۲ با حذف پژوهش‌هایی که اندازه اثرهای بالای گزارش داده بودند؛ سوگیری به صورت قابل توجهی کاهش یافته است که این موجب افزایش اعتبار یافته‌های مطالعه حاضر می‌شود.

## جدول ۲. شاخص N ایمن از خطا

۱/۹۵۹۹۶	۷۰.۹۴	تعداد مطالعات گمشدهای که مقدار P را به آلفا می‌رساند
۰/۰۵	۴۴	تعداد مطالعات مشاهده شده
۰/۰۰۰۰۱	۱۲	مقدار P برای مطالعات مشاهده شده
۲۴/۸۳۸۵۸	۴۱/۸۰۵*	مقدار Z برای مطالعات مشاهده شده
		آلفا
		باقیمانده (دنباله)

در جدول ۲ پس از بررسی شاخص N ایمن از خطا مشخص شد که اندازه اثر ترکیبی محاسبه شده، پس از ورود ۷۰۹۴ پژوهش با اندازه اثر صفر به پژوهش‌های حاضر، معنادار نخواهد بود. این تعداد بالا نشان می‌دهد که اندازه اثر فراتحلیل حاضر از اطمینان بالایی برخوردار است.

## جدول ۳. شاخص های ناهمگونی بر حسب متغیر نوع درمان

نوع درمان	Q	درجه آزادی	مجدور I
درمان مواجهه و جلوگیری از پاسخ	۴۱/۸۰۵*	۱۲	۷۱/۲۹۵
درمان شناختی-رفتاری	۸۷/۶۵۹*	۱۸	۷۹/۴۶۶
درمان‌های رفتاری موج سوم	۳۹/۲۴۷*	۱۱	۷۱/۹۷۲

\* $P < 0/05$  \*\* $P < 0/01$

همانطور که جدول ۳ نشان می‌دهد؛ مقدار Q برای کل ۴۴ اندازه اثر در نظر گرفته شده، ۱۸۲/۸۷۸ است که با درجه آزادی ۴۳ در سطح خطای کمتر از ۰/۰۵ معنادار است. مقدار مجدور I نیز ۷۶/۴۸۷ محاسبه شده است. مقدار هر دو پارامتر نشان می‌دهد که ناهمگونی در پژوهش‌های فوق بسیار بالا است. وجود ناهمگونی دلایل مختلفی دارد. یکی از آن‌ها ممکن است؛ وجود متغیر تعديل‌کننده باشد که شناسایی آن در پژوهش‌های فراتحلیل از ارزش بالایی برخوردار است. در فراتحلیل حاضر اثربخشی سه درمان مواجهه و جلوگیری از پاسخ، درمان شناختی-رفتاری و درمان‌های موج سوم بررسی شد. بنابراین متغیر نوع درمان می‌تواند که یکی از عوامل بالا بودن مقدار ناهمگونی Q باشد. از میان ۴۴ اندازه اثر حاضر، ۱۳ اندازه اثر مربوط به درمان مواجهه و جلوگیری از پاسخ، ۱۹ اندازه اثر مربوط به درمان شناختی-رفتاری و ۱۲ اندازه اثر مربوط به درمان‌های موج سوم بود. میزان ناهمگونی با توجه به مقادیر Q گزارش شده در جدول ۳ کاهش یافته است؛ اما همچنان ناهمگونی از لحاظ آماری معنادار است و با توجه به کمبود اطلاعات پژوهش‌های صورت گرفته بررسی دیگر متغیرهای تعديل کننده ممکن نبود. با توجه به وجود ناهمگونی در اندازه‌های اثر و با توجه به فرض الگوی اثرات تصادفی برای ترکیب اندازه اثرها در این

فراتحلیل مقایسه اثربخشی درمان مواجهه و پیشگیری از پاسخ ...

فراتحلیل، از الگوی اثرات تصادفی استفاده و نتیجه تحلیل اندازه اثر ترکیبی بر حسب نوع درمان در جدول ۴ ارائه شد.

#### جدول ۴. اندازه اثر ترکیبی الگوی تصادفی درمان‌های مواجهه و پیشگیری از پاسخ، درمان شناختی-رفتاری و درمان‌های موج سوم بر اختلال وسوسی-اجباری

روش	تعداد	اندازه اثر		فاصله اطمینان درصد ۹۵ مقدار Z	اندازه اثر حد پایین	اندازه اثر حد پایین	اندازه اثر ترکیبی
		حد پایین	حد پایین				
درمان مواجهه و جلوگیری از پاسخ	۱۳			۱/۸۱۵**	۱/۳۲۸	۲/۳۰۳	۷/۲۹۵۱
درمان شناختی-رفتاری	۱۹			۱/۵۴۲**	۱/۱۷۷	۱/۹۰۶	۸/۲۹۱۲
درمان‌های رفتاری موج سوم	۱۲			۱/۶۸۸**	۱/۲۲۵	۲/۱۵۱	۷/۱۴۲۳
کل	۴۴			۱/۶۵۳***	۱/۴۰۶	۱/۹	۱۳/۱۲۱

\*P<0/.05 \*\*P<0/.01

جدول ۴ نشان می‌دهد که از لحاظ آماری هر سه درمان مواجهه و جلوگیری از پاسخ، درمان شناختی-رفتاری و درمان‌های موج سوم در کاهش علائم اختلال وسوسی-اجباری به طور معنادار موثر هستند. همچنین با استفاده از آزمون همگوئی اندازه اثر Q بین گروهی، معنادار بودن تفاوت موجود اندازه اثرهای ترکیبی مداخله‌های فوق بر نابهنجاری وسوسی-اجباری بررسی شد که معنادار نبود ( $Q=0/۸۰۷$ ,  $P=0/۶۸۸$ ,  $df=2$ ). بنابراین با توجه به یافته حاضر می‌توان نتیجه گرفت که در کاهش علائم وسوسی-اجباری هیچ‌یک از سه درمان فوق بر دیگری برتری ندارد. در ادامه برای بررسی معناداری تفاوت مشاهده شده بین اندازه اثرهای ترکیبی درمان‌های مبتنى بر پذیرش و تعهد، درمان مبتنى بر توجه آگاهی و فراشناخت درمانی هریک با ۴ اندازه اثر در حوزه درمان‌های موج سوم، در فراتحلیل حاضر نیز از آزمون همگوئی اندازه اثر Q بین گروهی استفاده شد. نتیجه حاصل از این ارزیابی نیز عدم وجود تفاوت معنادار بین درمان‌های فوق را نشان داد ( $Q=0/۷۳۲$ ,  $P=0/۶۹۴$ ). لازم به ذکر است که بهعلت تعداد کم پژوهش در زمینه درمان‌های مذکور ممکن است که یافته حاصل از این بررسی با خطا همراه باشد.

#### بحث و نتیجه‌گیری

در این پژوهش به منظور سازماندهی و جمع‌بندی یافته‌های پیشین در زمینه تعیین اندازه اثر درمان‌های مواجهه و جلوگیری از پاسخ، درمان شناختی-رفتاری و درمان‌های موج سوم بر کاهش نشانه‌ها و علائم اختلال وسوسی-اجباری و مقایسه میزان اثربخشی درمان‌های یاد شده از روش فراتحلیل استفاده شد. نتایج حاصل از این فراتحلیل نشان داد که مداخله‌های مواجهه و پیشگیری از پاسخ، درمان شناختی-رفتاری و درمان‌های موج سوم به طور معناداری در کاهش علائم اختلال

وسواسی-اجباری موثرند و طبق معیار کو亨ن ۱۹۸۶ از اندازه اثرهای بالایی برخوردارند. همچنین مشخص شد که از لحاظ آماری تفاوت بین سه درمان باد شده در بهبود اختلال وسواسی-اجباری معنادار نیست. یافتههای حاصل از این فراتحلیل در حوزه رفتار درمانی مواجهه و پیشگیری از پاسخ و درمان شناختی-رفتاری با نتایج پژوهش‌های اوست، هاونین، هنسین و کوال (۲۰۱۵)، جانسون و هوگارد (۲۰۰۹)، روزا-آلکازا و همکاران (۲۰۰۸)، اولانتوجی، داویس، پاورس و اسمیت (۲۰۱۳) و اسدی، شیر علی پور، شکوری و محمدخانی (۱۳۹۱) همخوان است.

در پژوهش اوست (۲۰۱۵)، میزان اثربخشی درمان‌های مواجهه و پیشگیری از پاسخ و درمان شناختی-رفتاری بر بهبود اختلال وسواسی-اجباری در قالب فراتحلیل و بر اساس پژوهش‌های منتشرشده بین سال‌های ۱۹۹۳ تا ۲۰۱۴ بررسی شده بود و اندازه اثر درمان مواجهه و پیشگیری از پاسخ و درمان شناختی-رفتاری در مقیاس  $\eta$  هجز به ترتیب برابر با  $2/06$  و  $1/31$  و تفاوت موجود بین اندازه اثر دو درمان یاد شده فاقد معناداری گزارش شده بود. همچنین در پژوهش جانسون و هوگارد (۲۰۰۹) تاثیر درمان گروهی دو رویکرد درمانی مواجهه و جلوگیری از پاسخ و درمان شناختی-رفتاری بر بهبود علائم اختلال وسواسی-اجباری به صورت فراتحلیل بررسی شد. طبق نتایج گزارش شده، درمان گروهی یاد شده در کاهش نشانه‌های اختلال وسواسی-اجباری با اندازه اثر  $1/12$  موثر بوده است. در پژوهش روزا-آلکازا و همکاران (۲۰۰۸) نیز اثربخشی درمان مواجهه و پیشگیری از پاسخ، شناخت درمانی و درمان ترکیبی مواجهه و پیشگیری از پاسخ و شناخت درمانی بر کاهش نشانه‌های اختلال وسواسی-اجباری بررسی شده و نتایج فراتحلیل آن‌ها بیانگر این بود که هر سه رویکرد درمانی مواجهه و پیشگیری از پاسخ، شناخت درمانی و درمان ترکیبی مواجهه و پیشگیری از پاسخ و شناخت درمانی به ترتیب با اندازه اثرهای  $1/127$ ،  $1/120$  و  $1/090$  موثر بوده‌اند. همچنین پژوهش اولانتوجی و همکاران (۲۰۱۳) نیز که در حوزه درمان شناختی-رفتاری صورت گرفته است؛ اندازه اثر گزارش شده در مقیاس  $\eta$  هجز برابر با  $1/39$  شده، که طبق جدول کو亨ن ۱۹۸۶ اندازه اثر قابل توجهی است. علاوه بر پژوهش‌های خارجی یاد شده، فراتحلیل حاضر با پژوهش اسدی و همکاران (۱۳۹۱) نیز که به مطالعه فراتحلیل اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر وسوس در نمونه‌های ایرانی پرداخته است؛ همراستا است. اندازه اثر پژوهش مذکور  $1/63$  گزارش شده است.

لازم به ذکر است که در حوزه اثربخشی درمان‌های موج سوم بر اختلال وسواسی-اجباری پژوهش به صورت فراتحلیل چندانی وجود ندارد و نمی‌توان نتایج این بخش از پژوهش را با یافته‌های پیشین مقایسه کرد. بنابراین یکی از نقاط قوت فراتحلیل حاضر، مقایسه اثربخشی دو رویکرد رفتاری و شناختی-رفتاری با درمان‌های موج سوم رفتاری در کاهش علائم اختلال وسواسی-اجباری بود.

## فراتحلیل مقایسه اثربخشی درمان مواجهه و پیشگیری از پاسخ ...

یکی دیگر از نتایج فراتحلیل حاضر به این نکته اشاره دارد که تفاوت بین میزان اثربخشی درمان مواجهه و پیشگیری از پاسخ و درمان شناختی-رفتاری از لحاظ آماری معنادار نیست. این نتیجه بیانگر این است که درمان شناختی-رفتاری برخلاف انتظار، با به کار گیری فنون شناختی نسبت به درمان مواجهه و پیشگیری از پاسخ در افزایش میزان بهبود بیماران دچار اختلال اختلال وسوسی-اجباری چندان موفق نیست. در تبیین این نتیجه می‌توان گفت که اگرچه در درمان مواجهه و پیشگیری از پاسخ، نقص‌های شناختی به صورت مستقیم به چالش کشیده نمی‌شوند؛ اما مواجهه پی در پی افراد منجر به آن می‌شود که فرد نسبت به شرایط، جمع‌بندی نوینی داشته باشد؛ بنابراین در این روش درمانی شناخت افراد به صورت غیرمستقیم دستخوش تغییر قرار می‌گیرد (ریس، کوال، اوست، اسکجول، هنسن و هنسن، ۲۰۱۶). به عبارت دیگر می‌توان گفت که درمان مواجهه و پیشگیری از پاسخ، می‌تواند به شکل غیرمستقیم شناخت و باور افراد را تغییر دهد. همانطور که گفته شد درمان شناختی-رفتاری بر محتوای فکر افراد و درمان‌های موج سوم بر روند و فرایند فکر آن‌ها توجه دارد.

در این پژوهش سه مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان ذهن آگاهی و فراشناخت درمانی به عنوان درمان‌های موج سوم برای مقایسه انتخاب شد. هریک از درمان‌های یاد شده با تمرکز بر پارامترها و متغیرهای ویژه سعی در بهبود علائم اختلال وسوسی-اجباری و تبیین فرایند درمانی خود دارند. معناداری و میزان اندازه اثر درمان‌های موج سوم نیز دال بر اثربخشی بالای این درمان در بهبود علائم اختلال وسوسی-اجباری است. اما با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر نشانی از برتری درمان‌های موج سوم بر دو درمان مواجهه و پیشگیری از پاسخ و درمان شناختی-رفتاری یافت نشد. همچنین مقایسه بین درمان‌های موج سوم هم نشان داد که تفاوت بین سه نوع درمان موج سومی معنادار نیست.

بنابراین بر اساس نتایج فراتحلیل حاضر که تفاوت بین سه نوع درمان از لحاظ اثربخشی معنادار نبوده است و به علاوه برخلاف ادعای رویکرد موج سوم که در پاسخ به محدودیت‌های موج اول و دوم رفتاری یعنی مواجهه و پیشگیری از پاسخ و درمان شناختی-رفتاری و برای ارتقا اثربخشی حوزه شناختی-رفتاری برای اختلال‌های روان‌شناختی مطرح شده است؛ تفاوتی بین درمان‌های موج سوم با دو موج قبلی از لحاظ کاهش علائم وسوسی-اجباری بیماران ایرانی دیده نشد. شاید این عدم تفاوت را بتوان اینگونه تفسیر کرد که همه رویکردهای درمانی فارغ از تفاوت‌های اساسی در مبانی نظری و فنون مورد استفاده خود دارای عوامل مشترکی هستند که به شدت با نتایج مثبت درمانی ارتباط دارند. در این راستا پژوهش زاربو، تاسکا، کتفی و کومپار (۲۰۱۶) نشان می‌دهد که در فرایند درمانی عاملی چون برقراری رابطه درمانی مناسب، ایجاد شناخت نسبت به وضعیت موجود، ایجاد امید و انتظار درمان و اصلاح پاسخ‌های مراجع به عنوان عوامل مشترک مؤثر

هستند. همچنین در بررسی اختصاصی تر نتایج فراتحلیل حاضر، می‌توان به این نکته توجه کرد که مهم‌ترین فرایند و تاثیر درمانی در درمان اختلال وسوسی-اجباری، مواجهه است که در هر سه رویکرد، به نحوی اتفاق می‌افتد و شاید به همین دلیل است که افزودن مؤلفه‌های شناختی، ذهن آگاهی و پذیرش به درمان رفتاری مبتنی بر مواجهه و پیشگیری از پاسخ باعث ارتقا اثربخشی آن در درمان بیماران ایرانی دچار اختلال وسوسی-اجباری نشده است.

مانند دیگر پژوهش‌ها در این پژوهش نیز محدودیت‌هایی بر صحت و اعتبار نتایج و یافته‌های فراتحلیل حاضر تاثیرگذار بوده است. یکی از مرسوم‌ترین محدودیت‌ها مربوط به تعداد کم پژوهش‌های منتشر شده در حوزه مورد مطالعه است. در این پژوهش نیز این مشکل به ویژه در زمینه درمان‌های موج سوم که به نسبت روشی جدید و بدیع به حساب می‌آید؛ مشهود بود. بنابراین پیشنهاد می‌شود که پژوهشگران با افزایش پژوهش‌ها در حوزه یاد شده امکان انجام پژوهش‌های فراتحلیل را با دقت بیشتر فراهم آورند. از سوی دیگر برخی از پژوهشگران تنها به گزارش نتایج نهایی اکتفا کرده بودند و این امر موجب شد تا امکان بررسی متغیرهای زیربنایی در میزان اثربخشی درمان‌ها و شناسایی تفاوت‌های موجود در بین آن‌ها میسر نشود. بنابراین پیشنهاد می‌شود تا پژوهشگران یافته‌ها و نتایج ضروری را گزارش کنند تا بررسی متغیرهای تعديل کننده‌ای چون جنس آزمودنی‌ها، روش‌های انفرادی یا گروهی اجرای پژوهش و میزان مهارت درمانگران امکان‌پذیر شود.

## سپاسگزاری

لازم است از خانم مهین اکبری و آقای امید نصیری که همکاری ارزشمندی در جمع‌آوری مقاله‌های مورد استفاده در این فراتحلیل داشتند؛ تشکر و سپاسگزاری شود. این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی مستقل و با هزینه شخصی پژوهشگران انجام شده است.

## منابع

- اسدی، مسعود، شیرعلی پور، اصغر، شکوری، زینب، و محمدخانی، شهرام. (۱۳۹۱). فراتحلیل اثربخشی درمان شناختی-رفتاری در درمان بیماران مبتلا به اختلال وسوسی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی بزد، ۲۰(۳): ۳۹۶-۴۰۵.
- طاهری، سارا، و سجادیان، ایلنار. (۱۳۹۶). اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر علائم خستگی، شفقت خود و ذهن آگاهی کارکنان دارای سندروم خستگی مزمن. *فصلنامه روان‌شناسی کاربردی*، ۹(۱): ۱۷۱-۱۴۵.

فراتحلیل مقایسه اثربخشی درمان مواجهه و پیشگیری از پاسخ ...

محمدی شیر محله، فاطمه، جمهوری، فرهاد، کراسکیان، آدیس، و مليحی الذاکرینی، سعید. (۱۳۹۵). اثربخشی ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب و قند خون بیماران دیابتی با نوع شخصیت بازدارنده. *فصلنامه روان‌شناسی کاربردی*، ۱۰(۲): ۱۵۸-۱۳۹.

## References

- Abramowitz, J. S., Lackey, G. R., & Wheaton, M. G. (2009). Obsessive-compulsive symptoms: The contribution of obsessional beliefs and experiential avoidance. *Journal of Anxiety Disorders*, 23(2): 160-166.
- Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J., & Rothstein, H. (2005). *Comprehensive meta-analysis 2.0*. Englewood, NJ: Biostat.
- Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J., & Rothstein, H. R. (2009). *Publication bias*. Introduction to meta-analysis: John Wiley & Sons.
- Fisher, P. L. & Wells, A. (2008). Metacognitive therapy for Obsessive-Compulsive Disorder: a case series. *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry*, 39(2): 117-132.
- Fontenelle, I. S., Fontenelle, L. F., Borges, M. C., Prazeres, A. M., Rangé, B. P., Mendlowicz, M. V., & Versiani, M. (2010). Quality of life and symptom dimensions of patients with Obsessive-Compulsive Disorder. *Psychiatry Research*, 179(2): 198-2003.
- Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2011). *Acceptance and commitment therapy: The process and practice of mindful change*, 2nd Ed .New York: The Guilford Press.
- Hertenstein, E., Rose, N., Voderholzer, U., Heidenreich, T., Nissen, C., Thiel, N., Herbst, N., & Külz, A.K. (2012). Mindfulness-based cognitive therapy in Obsessive-Compulsive Disorder—A qualitative study on patients' experiences. *BMC Psychiatry*, 12(1):185-195.
- Jónsson, H., & Hougaard, E. (2009). Group Cognitive Behavioural Therapy for Obsessive-Compulsive Disorder: a systematic review and meta-analysis. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 119(2): 98-106.
- Kahl, K. G., Winter, L., & Schweiger, U. (2012). The third wave of cognitive behavioural therapies: what is new and what is effective? *Current Opinion in Psychiatry*, 25(6): 522-528.
- Maher, M., Huppert, J., Chen, H., Duan, N., Foa, E., Liebowitz, M., & Simpson, H. B. (2010). Moderators and predictors of response to Cognitive-Behavioral Therapy augmentation of pharmacotherapy in Obsessive-Compulsive Disorder. *Psychological Medicine*, 40(12): 2013-2023.
- Mancebo, M. C., Grant, J. E., Pinto, A., Eisen, J. L., & Rasmussen, S. A. (2009). Substance use disorders in an Obsessive-Compulsive Disorder clinical sample. *Journal of Anxiety Disorders*, 23(4): 429-435.
- Marcks, B. A., Weisberg, R. B., Dyck, I., & Keller, M. B. (2011). Longitudinal course of Obsessive-Compulsive Disorder in patients with anxiety disorders: a

- 15-year prospective follow-up study. *Comprehensive Psychiatry*, 52(6): 670-677.
- Markarian, Y., Larson, M. J., Aldea, M. A., Baldwin, S. A., Good, D., Berkeljon, A., Murphy, T.K., Storch, E.A. & McKay, D. (2010). Multiple pathways to functional impairment in Obsessive-Compulsive Disorder. *Clinical Psychology Review*, 30(1): 78-88.
- Olatunji, B. O., Davis, M. L., Powers, M. B., & Smits, J. A. (2013). Cognitive-Behavioral Therapy for Obsessive-Compulsive Disorder: A meta-analysis of treatment outcome and moderators. *Journal of Psychiatric Research*, 47(1): 33-41.
- Osland, S., Arnold, P. D., & Pringsheim, T. (2018). The prevalence of diagnosed Obsessive-Compulsive Disorder and associated comorbidities: A population-based Canadian study. *Psychiatry research*. 2(3): 137-142.
- Öst, L. G., Havnen, A., Hansen, B., & Kvæle, G. (2015). Cognitive Behavioral Treatments of Obsessive-Compulsive Disorder. A systematic review and meta-analysis of studies published 1993–2014. *Clinical Psychology Review*, 40(1): 156-169.
- Podea, D., Suciu, R., Suciu, C., & Ardelean, M. (2009). An update on the Cognitive -Behavior Therapy of Obsessive-Compulsive Disorder in adults. *Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies*, 9(2): 221-233.
- Riise, E. N., Kvæle, G., Öst, L. G., Skjold, S. H., Hansen, H., & Hansen, B. (2016). Concentrated Exposure and Response Prevention for adolescents with Obsessive-Compulsive Disorder: An effectiveness study. *Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders*, 11(1) :13-21.
- Rosa-Alcázar, A. I., Sánchez-Meca, J., Gómez-Conesa, A., & Marín-Martínez, F. (2008). Psychological treatment of Obsessive-Compulsive Disorder: A meta-analysis. *Clinical Psychology Review*, 28(8): 1310-1325.
- Storch, E. A., Abramowitz, J. S., & Keeley, M. (2009). Correlates and mediators of functional disability in Obsessive-Compulsive Disorder. *Depression and anxiety*, 26(9): 806-813.
- Torp, N.C., Dahl, K., Skarphedinsson, G., Thomsen, P.H., Valderhaug, R., Weidle, B., Melin, K.H., Hybel, K., Nissen, J.B., Lenhard, F., & Wentzel-Larsen, T. (2015). Effectiveness of Cognitive Behavior Treatment for pediatric Obsessive-Compulsive Disorder: Acute outcomes from the Nordic long-term OCD treatment study (NordLOTS). *Behaviour Research and Therapy*, 64(1): 15-23.
- Twohig, M. P., Abramowitz, J. S., Bluett, E. J., Fabricant, L. E., Jacoby, R. J., Morrison, K. L., Reuman, L., & Smith, B. M. (2015). Exposure Therapy for OCD from an acceptance and commitment therapy (ACT) framework. *Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders*, 6(1) :167-173.
- Twohig, M. P., Hayes, S. C., Plumb, J. C., Pruitt, L. D., Collins, A. B., Hazlett-Stevens, H., & Woidneck, M. R. (2010). A randomized clinical trial of acceptance and commitment therapy versus progressive relaxation training for Obsessive-Compulsive Disorder. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 78(5): 705-716.

Zarbo, C., Tasca, G. A., Cattafi, F., & Compare, A. (2016). Integrative psychotherapy works. *Frontiers in Psychology*, 6(2): 1-3.

\*\*\*

### اطلاعات توصیفی پژوهش‌ها

d	مقدار آماره	ابزار	نوع درمان	پژوهش
۲۲/۷۴	(F)۱۴۰/۹**	بیل براون	مواجهه و پیشگیری از پاسخ	ابوالقاسمی و صفریزدی (۱۳۹۱)
۱/۷۰۹	(F)۳۰/۸۸**	مادزلی	فراشناخت	ابوالقاسمی، حسنعلی زاده، کاظمی و نرمانی (۱۳۸۹)
۰/۱۴۳	(F)۴۲۸/۳**	بیل براون	مواجهه و پیشگیری از پاسخ	اصفهانی، صفری و کجباو (۱۳۹۲)
۹/۸۵۹	(F) ۴۲۸/۳**	مادزلی	مواجهه و پیشگیری از پاسخ	اصفهانی، نشاط دوست، مولوی و عابدی (۱۳۸۶)
۰/۰۰۰۱	(F) ۲۴/۸۵**	پادوا	رفتار درمانی شناختی (آلدگی)	اصل علوی پایدار، خدابخش (۱۳۹۶)
۰/۰۰۰	(F) ۲۹/۵۲**	پادوا	فراشناخت (کل)	اصل علوی پایدار، خدابخش (۱۳۹۶)
۱/۱۴۵	(F) ۲۹/۵۸**	پادوا	فراشناخت (آلدگی)	اصل علوی پایدار، خدابخش (۱۳۹۶)
۱/۳۴۲	(F) ۱۶/۵۲**	پادوا	رفتار درمانی شناختی (کل)	اصل علوی رو، خدابخش (۱۳۹۶)
۰/۷۹۴	(t) ۳/۳۷**	مادزلی	رفتار درمانی شناختی	اکرمی، کلانتری عرضی، عابدی و معروفی (۱۳۸۹)
۰/۷۰۶	(t) ۲/۳۴*	مادزلی	فراشناخت	اکرمی، کلانتری عرضی، عابدی و معروفی (۱۳۸۹)
۵/۶۷۴	(F) ۸/۶۱**	بیل براون	رفتار درمانی شناختی	ایزدی، نشاط دوست، عسگری و عابدی (۱۳۹۳)
۷/۰۲۲	(F) ۱۰/۵۷**	بیل براون	رفتار درمانی شناختی (وسواس فکری)	ایزدی، نشاط دوست، عسگری و عابدی (۱۳۹۳)
۱/۷۲۰	(F) ۴/۸۵*	بیل براون	رفتار درمانی شناختی (عملی)	ایزدی، نشاط دوست، عسگری و عابدی (۱۳۹۳)
۰/۳۳۹	(F) ۱۰/۵۷**	بیل براون	پذیرش و تعهد (وسواس فکری)	ایزدی، نشاط دوست، عسگری و عابدی (۱۳۹۳)
۱/۷۲۰	(F) ۴/۸۵**	بیل براون	پذیرش و تعهد (وسواس عملی)	ایزدی، نشاط دوست، عسگری و عابدی (۱۳۹۳)
۱/۲۶۸	(F) ۸/۶۱**	بیل براون	پذیرش و تعهد	ایزدی، نشاط دوست، عسگری و عابدی (۱۳۹۳)
۱/۶۰۲	(F) ۱۲/۴۶**	مادزلی	مواجهه و پیشگیری از پاسخ	ایمانی، علیلو، بخشی پور، فرنام و قلی زاده (۱۳۸۸)
۲/۸۹۵	(F) ۱۲/۴۶**	مادزلی	رفتار درمانی شناختی	ایمانی، علیلو، بخشی پور، فرنام و قلی زاده (۱۳۸۸)
۰/۵۰۹	(F) ۳/۶۷۱	مادزلی	ذهن آگاهی	آشیری، نصیریان و زارعی محمود آبادی (۱۳۹۴)
۰/۷۴۵	گزارش نشده	بیل براون	رفتار درمانی شناختی	اکوچکیان، حقیقیزاده، سیرویی نژاد، عمرانی فروماضی (۱۳۹۵)
(t)				
۵/۵۱۷	(F) ۲۲/۰/۱**	مادزلی	رفتار درمانی شناختی	حمدید، عطایی مغانلو و عیدی بایگی (۱۳۹۱)
۳/۷۴۷	(F) ۱۰/۱۳**	مادزلی	مواجهه و پیشگیری از پاسخ (واقعی)	دل آرامقلو، مهری و مولوی (۱۳۹۴)
۱/۹۹۳	(F) ۱۰/۱۷**	مادزلی	مواجهه و پیشگیری از پاسخ (تجسمی)	دل آرامقلو، مهری و مولوی (۱۳۹۴)
۰/۵۸۴	(F) ۳۴/۳۹**	بیل براون	رفتار درمانی شناختی	دلیر، علی پور، زارع و فرزاد (۱۳۹۴)
۲/۰۰۴	(F) ۱۵/۹۴**	مادزلی	رفتار درمانی شناختی (کل)	دلیر، علی پور، زارع و فرزاد (۱۳۹۴)
۱/۵۱۰	(F) ۰/۹۸	مادزلی	رفتار درمانی شناختی (وارسی)	دلیر، علی پور، زارع و فرزاد (۱۳۹۴)
۱/۸۵۰	(F) ۷/۲۱**	مادزلی	رفتار درمانی شناختی (شست و شو)	دلیر، علی پور، زارع و فرزاد (۱۳۹۴)
۱/۵۷۲	(F) ۰/۳۱	مادزلی	رفتار درمانی شناختی (کندی)	دلیر، علی پور، زارع و فرزاد (۱۳۹۴)
۲/۱۶۶	(F) ۲/۳۷	مادزلی	رفتار درمانی شناختی (ترتید)	دلیر، علی پور، زارع و فرزاد (۱۳۹۴)
۱۷/۷۶۰	(F) ۱۶۹/۸۹**	بیل براون	فراشناخت	رجعبیان، وطنخواه و خلعتبری (۱۳۹۵)
۱۱/۰۲	(F) ۹۲۰/۰۶**	بیل براون	فراشناخت	روحانی، رفیعی شفیق، توانایی یوسفیان، عباس زاده و گوشویی (۱۳۹۵)

## مهدی اکبری و زهره سادات حسینی

۱/۷۵۱	(F) ۱۳/۷۰**	مادرلی	ذهن اگاهی (تردید)	سجادیان، نشاط دوست، مولوی و معروفی (۱۳۸۴)
۳/۷۰۴	(F) ۶۱/۷۰**	مادرلی	ذهن اگاهی (کل)	سجادیان، نشاط دوست، مولوی و معروفی (۱۳۸۴)
۱/۲۰۶	(F) ۶/۵*	مادرلی	ذهن اگاهی (شستشو)	سجادیان، نشاط دوست، مولوی و معروفی (۱۳۸۴)
۴/۱۱۴	(F) ۷۶/۱۷**	مادرلی	ذهن اگاهی (وارسی)	سجادیان، نشاط دوست، مولوی و معروفی (۱۳۸۴)
۱/۰۱۱	(F) ۴/۵۹۸*	مادرلی	ذهن اگاهی (کندی و تکرار)	سجادیان، نشاط دوست، مولوی و معروفی (۱۳۸۴)
۲/۰۷۹	(F) ۳۴/۵۵**	مادرلی	رفتار درمانی شناختی	صالحی، موسوی، ساریچلو و قافله باشی (۱۳۹۳)
۱/۰۵۸	(F) ۱۱/۱۳**	مادرلی	رفتار درمانی شناختی (وارسی)	صالحی، موسوی، ساریچلو و قافله باشی (۱۳۹۳)
۱/۱۴۳	(F) ۱۰/۸۵**	مادرلی	رفتار درمانی شناختی (تکرار)	صالحی، موسوی، ساریچلو و قافله باشی (۱۳۹۳)
۱/۱۶۵	(F) ۱۱/۱۴**	مادرلی	رفتار درمانی شناختی (شست و شو)	صالحی، موسوی، ساریچلو و قافله باشی (۱۳۹۳)
۱/۵۹۵	(F) ۷/۱۳۹*	مادرلی	رفتار درمانی شناختی (تردید)	صالحی، موسوی، ساریچلو و قافله باشی (۱۳۹۳)
۱/۴۵۵	(F) ۱۶/۶۱**	مادرلی	رفتار درمانی شناختی	صرامی، امیری، نشاط دوست و مولوی (۱۳۸۸)
۲/۰۵۵	(F) ۳۷/۷۲**	مادرلی	رفتار درمانی شناختی	صرامی، نشاط دوست، امیری، مولوی و آکوچکیان (۱۳۸۸)
۲/۳۹۹	(F) ۴۹/۵۷**	SCL-90-R	رفتار درمانی شناختی	عاصمی زواره، عسگری، چیت ساز، مهرابی و جهانبازی (۱۳۹۲)
۲/۶۴۹	(F) ۹/۹۱**	مادرلی	پذیرش و تعهد	غضنفری، امیری و زنگی آبادی (۱۳۹۴)
۱/۴۴۰	(F) ۹/۹۱**	مادرلی	فراشناخت	غضنفری، امیری و زنگی آبادی (۱۳۹۴)
۲/۷۶۷	(F) ۱۴۳/۲**	مادرلی	مواجهه و پیشگیری از پاسخ (وارسی)	قمری گیوی، نریمانی و محمودی (۱۳۹۳)
۲/۰۵۸	(F) ۷۱/۹۷**	مادرلی	مواجهه و پیشگیری از پاسخ (تکرار)	قمری گیوی، نریمانی و محمودی (۱۳۹۲)
۱/۸۴۵	(F) ۴۶/۲۵**	مادرلی	مواجهه و پیشگیری از پاسخ (شست و شو)	قمری گیوی، نریمانی و محمودی (۱۳۹۲)
۱/۶۸۵	(F) ۴۶/۴۸**	مادرلی	مواجهه و پیشگیری از پاسخ (تردید)	قمری گیوی، نریمانی و محمودی (۱۳۹۲)
۲/۰۰۱	(F) ۶۳/۵۱**	مادرلی	مواجهه و پیشگیری از پاسخ	قمری، کیانی و میرهاشمی (۱۳۹۵)
۱/۱۲۴	(F) ۶۳/۵۱**	مادرلی	مواجهه و پیشگیری از پاسخ (وارسی)	قمری، کیانی و میرهاشمی (۱۳۹۵)
۲/۱۲۳	(F) ۶۳/۵۱**	مادرلی	مواجهه و پیشگیری از پاسخ (تکرار)	قمری، کیانی و میرهاشمی (۱۳۹۵)
۰/۰۲۲	(F) ۶۳/۵۱**	مادرلی	مواجهه و پیشگیری از پاسخ (شست و شو)	قمری، کیانی و میرهاشمی (۱۳۹۵)
۰/۷۳۶	(F) ۶۳/۵۱**	مادرلی	مواجهه و پیشگیری از پاسخ (تردید)	قمری، کیانی و میرهاشمی (۱۳۹۵)
۳/۳۶۲	(t) ۹/۵۱**	بیل براون	رفتار درمانی شناختی (عملی)	کاملی، حسین پور مقدم، زندی پور و قاسم زاده (۱۳۹۲)
۳/۱۸۲	(t) ۹/۰۰**	بیل براون	رفتار درمانی شناختی (کل)	کاملی، حسین پور مقدم، زندی پور و قاسم زاده (۱۳۹۲)
۱/۷۸۵	(t) ۵/۰۵**	بیل براون	رفتار درمانی شناختی (فکری)	کاملی، حسین پور مقدم، زندی پور و قاسم زاده (۱۳۹۲)
۱/۳۹۹	(F) ۵/۷۱**	پادوا	رفتار درمانی شناختی	محمدزاده، برجعلی، سهرابی و دلار (۱۳۸۸)
۰/۳۷۴	(F) ۸/۰۵**	پادوا	رفتار درمانی شناختی (وارسی)	محمدزاده، برجعلی، سهرابی و دلار (۱۳۸۸)
۱/۴۰۱	(F) ۶/۶۴**	پادوا	رفتار درمانی شناختی (آلدگی)	محمدزاده، برجعلی، سهرابی و دلار (۱۳۸۸)
۰/۲۸۴	(F) ۶/۰۱**	پادوا	رفتار درمانی شناختی (عدم کنترل یا فعالیت ذهنی)	محمدزاده، برجعلی، سهرابی و دلار (۱۳۸۸)
۲/۷۰۲	(F) ۴۱/۷۵**	مادرلی	مواجهه و پیشگیری از پاسخ (گروهی)	مکملی، مولوی و عابدی (۱۳۸۵)
۲/۴۴۹	(F) ۴۱/۷۵**	مادرلی	مواجهه و پیشگیری از پاسخ (فردی)	مکملی، مولوی و عابدی (۱۳۸۵)
۱/۳۴۲	(t) ۶/۳۳۸**	بیل براون	رفتار درمانی شناختی	ملکی، محمودزاده و بهمن آغلاقی (۱۳۹۵)
۱/۶۲۹	(F) ۳۲/۰۳**	بیل براون	ذهن اگاهی (کل)	موسوی مدنی، آتش پور و مولوی (۱۳۸۹)
۲/۰۸۴	(F) ۴/۱۶	مادرلی	ذهن اگاهی (شستشو)	موسوی مدنی، آتش پور و مولوی (۱۳۸۹)
۰/۹۶۵	(F) ۲۵/۲۸**	مادرلی	ذهن اگاهی (وارسی)	موسوی مدنی، آتش پور و مولوی (۱۳۸۹)

## فراتحلیل مقایسه اثربخشی درمان مواجهه و پیشگیری از پاسخ ...

۱/۴۹۹	(F) ۴۱/۱۹**	مادرزلی	ذهن آگاهی (کندی و تکرار)	موسوی مدنی، آتش پور و مولوی (۱۳۸۹)
۱/۱۶۹	(F) ۲۹/۸۶**	مادرزلی	ذهن آگاهی (تردید)	موسوی مدنی، آتش پور و مولوی (۱۳۸۹)
۳/۰۲۲	(F) ۱۳۸/۴**	بیل براون	رفتار درمانی شناختی (کل)	میکائیلی بارزیلی، احمدی و حسن ابادی (۱۳۹۰)
۲/۲۰۱	(F) ۳۹/۱۳**	بیل براون	رفتار درمانی شناختی (فکری)	میکائیلی بارزیلی، احمدی و حسن ابادی (۱۳۹۰)
۳/۲۳۷	(F) ۴۳/۸۳**	بیل براون	رفتار درمانی شناختی (عملی)	میکائیلی بارزیلی، احمدی و حسن ابادی (۱۳۹۰)
۱/۴۹	(F) ۶۴/۳۳**	بیل براون	مواجهه و پیشگیری از پاسخ (فکری)	نریمانی، ملکی پیربازاری، میکائیلی و ابوالقاسمی (۱۳۹۵)
۱/۰۵۳	(F) ۶۴/۳۳**	بیل براون	مواجهه و پیشگیری از پاسخ (عملی)	نریمانی، ملکی پیربازاری، میکائیلی و ابوالقاسمی (۱۳۹۵)
۰/۸۹۳	(F) ۲۷**	بیل براون	پذیرش و تعهد (عملی)	نریمانی، ملکی پیربازاری، میکائیلی و ابوالقاسمی (۱۳۹۵)
۱/۱۴۷	(F) ۲۷**	بیل براون	پذیرش و تعهد (فکری)	نریمانی، ملکی پیربازاری، میکائیلی و ابوالقاسمی (۱۳۹۵)
۱/۰۹۵	(F) ۱۳۸/۴**	بیل براون	رفتار درمانی شناختی (کل)	نویدیان، حق شناس، عابدی، باغبان و فاتحی زاده (۱۳۹۰)
۱/۰۹۵	(F) ۱۲۲/۲**	بیل براون	رفتار درمانی شناختی (فکری)	نویدیان، حق شناس، عابدی، باغبان و فاتحی زاده (۱۳۹۰)
۱/۰۹۵	(F) ۱۰/۱۸**	بیل براون	رفتار درمانی شناختی (عملی)	نویدیان، حق شناس، عابدی، باغبان و فاتحی زاده (۱۳۹۰)
۲/۳۹۵	(F) ۳۸/۲۴**	مادرزلی	رفتار درمانی شناختی	یوسفی و صالحی (۱۳۹۴)
۳/۱۵۲	(F) ۲۵/۸۲**	مادرزلی	ذهن آگاهی	یوسفی و صالحی (۱۳۹۴)

\*P<0/0.5 \*\*P<0/0.1